

## SERIGAN ESPONJAS VAGINALES

**Registro SAGARPA:** Q-0029-038

Hormonal. Esponjas intravaginales.



FÓRMULA	CADA ESPONJA DE POLIURETANO IMPREGNADO CONTIENE:
Medroxiprogesterona acetato (MAP)	60 mg
Etanol	0.5 mg
Excipiente c.s.p. (poliuretano)	1 esponja

**Presentación:** Bolsa con 25 esponjas intravaginales.

### Descripción:

Sincronización del estro e inducción de la actividad cíclica en época de anestro de las ovejas sexualmente maduras.

Se recomienda su aplicación en conjunto con la Gonadotropina sérica de yegua gestante. Si se aplica la esponja a hembras primíparas, estas deben contar con 7 meses de edad o pesar el 70% de su futuro peso como adultas.

**Via de Administración:** Intravaginal. La esponja debe colocarse con la ayuda de un aplicador y este deberá desinfectarse antes de su uso (no emplear alcoholes, cresoles, o fenoles). Cuando la aplicación de las esponjas en las corderas se dificulte, no se debe forzar la introducción del aplicador, si no realizar un masaje o una ruptura manual del himen si fuera necesario.

**Dosis Recomendada:** Una esponja Intravaginal y dejarla 12 a 14 días. Durante la época de anestro, las esponjas deben retirarse a los 12 o 14 días y administrar simultáneamente 400 a 600 UI de PSMG antes de retirada la esponja o 6 horas después de haberla retirado para evitar una disminución en la ovulación.



**Modo de Acción:** El Acetato de medroxiprogesterona es un progestágeno sintético (estructuralmente relacionado con la hormona endógena progesterona) con acción antiestrogénica, antiandrogénica y antagonotrópica. Inhibe las gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH) con la consiguiente inhibición de la maduración folicular y de la ovulación.

**Indicaciones:** Sincronización del estro e inducción de la actividad cíclica en época de anestro de las ovejas sexualmente maduras. Se recomienda su aplicación en conjunto con la Gonadotropina Sérica de Yegua gestante (PMSG). Si se aplica la esponja a ovejas primíparas, estas deben contar con 7 meses de edad o pesar el 70% de su futuro peso como adultas.

**Advertencias:** + Para evitar irritación vaginal no deje la esponja por un periodo largo de tiempo. + No se recomienda su colocación en hembras enfermas que presenten flujos vaginales anormales o que acaben de abortar. + No colocar las esponjas en hembras gestantes. + los operarios deben portar guantes durante la manipulación del producto. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO

**Especies:** Ovinos hembras sexualmente maduras

**Tiempo de Retiro:** No requiere.