



ANTIFEBRIL

Registro SAGARPA: Q-0907-018

Solución oral

Analgésico, antitrombótico, antipirético y antiinflamatorio

FÓRMULA	CADA ML CONTIENE:
Ácido acetilsalicílico	400 mg
Vehículo c. b. p.	1 ml

Presentación: Botellas de 1 litro y 5 litros.

Descripción:

La actividad farmacológica del ácido acetilsalicílico se debe principalmente al ácido salicílico, un metabolito que se forma después de la hidrólisis. Los efectos se producen por la inhibición de la ciclo-oxigenasa y síntesis de prostanoídes a partir del ácido araquidónico. También se inhibe la liberación de PGF_{2a} y PGE₂ así como la síntesis de tromboxanos a favor de la producción de prostaciclina PGI₂.

Como resultado, la agregación de plaquetas queda inhibida, lo que impide los procesos inflamatorios y trombóticos. ANTIFEBRIL también alivia el dolor sin producir decaimiento de los animales y disminuye la temperatura hasta los valores normales, debido a su acción inhibitoria sobre las prostaglandinas.

ANTIFEBRIL está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves de engorda, aves de reemplazo (ponedoras) y aves de combate. Para facilitar el restablecimiento de los parámetros fisiológicos normales de los animales, al actuar como analgésico, antitrombótico, antitérmico (antipirético) y antiinflamatorio. Como tratamiento sintomático de cuadros clínicos que cursen con dolor y fiebre, transporte de los animales, reacciones posvacunación, cortes de rabos, colmillos, despiques de aves, cambios de temperatura y como coadyuvante en enfermedades urinarias y digestivas.

Via de Administración: Oral, en el agua de bebida.



Dosis Recomendada: Administrar durante 2 a 3 días. Primer día 1 ml por litro de agua de bebida (0.2-0.4 ml por cada kg de peso corporal). Días siguientes 0.5 ml por litro de agua de bebida (0.1-0.2 ml por cada kg de peso corporal). Preparar el agua medicada cada 24 horas. La dosis se puede ajustar según las necesidades de los animales.

Advertencias: No administrar conjuntamente con anticoagulantes o corticosteroides. No usar en gallinas ponedoras cuando estén en producción de huevos para consumo humano ni en vacas lecheras en producción. No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a salicilatos o similares. No administrar a animales con insuficiencia renal y/o hepática o con enfermedad ácido péptica (úlceras gástricas). Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

Tiempo de Retiro: No se administre este producto 1 día antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.