



## CIPIONATO DE ESTRADIOL

**Registro SAGARPA:** Q-7124-003

Éster sintético del estrógeno natural de estradiol en solución inyectable.

| FÓRMULA                | CADA 100 ML CONTIENE: |
|------------------------|-----------------------|
| Cipionato de estradiol | 50 mg                 |
| Excipiente c.b.p.      | 100 ml                |

**Via de Administración:** Intramuscular.

**Dosis Recomendada:**

| Indicación | Benzonato se Estradiol al colocar el prostágeno (dispositivo) | Cipionato de Estradiol al retirar el prostágeno(dispositivo) |
|------------|---|--|
| IAFT       | 2 ml (2mg)  | 1 mg (0.5mg)   |

para infecundidad y enfermedades de la reproducción de hembras:

**Vacas:** 3 a 5 mg para infecundidad; 5 a 10 mg Metritis

**Yeguas:** 5 a 10 mg

**Ovejas:** 2 a 3 mg

**Cerdas:** 2 a 4 mg

**Perras:** 0.01 a 0.1 mg/kg



**Indicaciones:** En el ganado, los esteroides sintéticos de estradiol están indicados para la inducción y sincronización de celos y para terapia hormonal (retención de placenta, anestro, metritis, piometra y fetos momificados). También para su uso dentro de programas de inseminación artificial, en protocolos que combinan progestágenos, prostaglandinas y estrógenos.

**Advertencias:** Su uso está contraindicado en cachorros y hembras preñadas. Los efectos tóxicos encontrados después de la administración prolongada de estradiol comprenden hiperplasia del endometrio, cambios en el comportamiento y efectos sobre los procesos metabólicos. Los estrógenos en dosis pequeñas carecen de efectos tóxicos. Las dosis grandes y repetidas pueden causar ciertos trastornos indeseables; Así por ejemplo en la vaca provocan esfuerzos postpartum con prolapso vaginal e incluso del útero. También pueden producir aborto. La actividad prolongada de estrógenos llega a suprimir la función ovárica, se produce hipoplasia y se desarrollan quistes ováricos. Machos tratados con estrógenos sufren feminización. Almacénese en un lugar fresco y seco. No utilizar este producto en equinos destinados al consumo humano. Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgase entre 4 y 35°C. El laboratorio no se hace responsable por el uso no indicado en el producto. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO Su venta requiere receta médica cuantificada. PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO EL LABORATORIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO NO INDICADO DEL PRODUCTO

**Especies:** Bovinos hembras productoras de leche, de carne, yeguas, ovejas, porcinos hembras reproductoras, perras.