



D-COX

Registro SAGARPA: Q-7124-004

Anticoccidiano en premezcla.

FÓRMULA	CADA 1000 G CONTIENE:
Robenidina	66 g
Dinitro - orto - toloamida	66 g
Excipiente c.b.p.	1000 g

Presentación: Saco de 25 kg.

Via de Administración: Oral mezclado en el alimento

Dosis Recomendada: Aves: Metafiláctico: Pollo de engorda: 500 g/ton de alimento, en pollito de 1 día de edad, por 15 a 21 días. Repetir su uso a criterio del Médico Veterinario. Polla de reemplazo: 500 g/ton de alimento de 1 día de edad, por 15 a 21 días. Repetir su uso a criterio del Médico Veterinario, suspender su uso 2 semanas antes de iniciar postura

Indicaciones: Anticoccidiano de amplio espectro, con actividad sobre la primera y segunda generación de las principales Eimerias de las aves, sin inducción de resistencia pudiéndose usar en la mayoría de los programas anticoccidiales

Advertencias: Mezcle uniformemente el producto con el alimento balanceado y suspenda el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No usar este producto en aves de postura en producción. Almacénese en un lugar fresco y seco. Manténgase fuera del alcance de los niños. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

Especies: Aves: Pollo de engorda, pollita de reemplazo criadas en piso.