



SPIR

Registro SAGARPA: Q-0907-004

Antibiótico de amplio espectro en solución inyectable.

FÓRMULA	CADA ML CONTIENE:
Espiramicina	540.000 UI
Vehículo c.b.p.	1 ml

Presentación: Frascos de 100 ml y 250 ml.

Descripción:

La espiramicina es un antibacteriano del género de los macrólidos de amplio espectro que actúa como bacteriostático a dosis usuales y bactericida a altas dosis.

Su elevada eficacia está relacionada con su mecanismo de acción y con su mayor vida media tanto en la circulación como en los tejidos debido a su carácter lipofílico, donde alcanza altos niveles terapéuticos y se mantiene activa por periodos prolongados. Tiene muy baja toxicidad y posee una buena tolerancia.

La espiramicina es eficaz frente a bacterias grampositivas: *Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp*, *Clostridium spp*, *Diplococcus pneumoniae*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*; bacterias gramnegativas: *Brucella spp*, *Neisseria spp*, *Haemophilus spp*; protozoos: *Toxoplasma spp*, *Treponema hyodysenteriae*; además de *Rickettsias* y *Mycoplasmas*.

SPIR está indicado para bovinos, ovinos, caprinos y porcinos en bronconeumonías, enteritis bacteriana, artritis, metritis, toxoplasmosis y tratamiento de heridas infectadas.

Bovinos: Mastitis, vaginitis, metritis.

Porcinos: Coadyuvante en el control de gastroenteritis transmisible, neumonía enzoótica, rinitis atrófica y pleuroneumonía porcina.

Via de Administración: Intramuscular.

Dosis Recomendada: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 1.5 ml por cada 10 kg de peso corporal del animal cada 24-48 horas durante 2-3 días. Bovino adulto: 1 ml por cada 20 kg de peso corporal, cada 24 horas durante 2-3 días.

Advertencias: No administrar junto con lincosamidas. Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. Periodo de retiro: No se administre este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No se consuma la leche de los animales tratados hasta 96 horas después de la última aplicación. Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.