

NEOMAY

Reg. SAGARPA Q-0907-030

Polvo para solución oral.

Fórmula, Cada g contiene:

Neomicina (sulfato) 500 000 U.I.

Vehículo c.b.p. 1 g.

USO EN: Bovinos (terneros), porcinos (lechones destetados y cerdos de engorda), ovinos (corderos), caprinos (cabritos), equinos (potros) y aves (pollos de engorda, gallinas de postura, aves de combate, patos, pavos, codornices y perdices).

INDICACIONES:

NEOMAY (neomicina), es un antibiótico de la familia de los aminoglucósidos indicado para el tratamiento de infecciones gastrointestinales causadas por bacterias sensibles a la neomicina, como: Colibacilosis, Salmonelosis, Enteritis bacteriana, Disentería porcina, Colienterotoxemia (enfermedad de los edemas). También es útil en el control de la mortalidad en aves en crecimiento asociada a E. coli, susceptible a la neomicina.

DOSIS:

 Dosis terapéutica:

Cerdos, terneros y aves 0.5 g de NEOMAY/10 kg p.v., equivalente a 0.30 – 0.35 g/L de agua en cerdos; 0.25 g/L de agua en terneros; 0.30 g/L de agua en aves (exceptuando codornices: 0.10 g/L de agua y en perdices: 0.15 g/L de agua), cada 24 horas, durante 3 - 5 días.

Corderos y cabritos: 0.25 a 0.30 g de NEOMAY/10 kg p.v., equivalente a 0.3 g/L de agua. Cada 12 horas, durante 3 - 4 días.

Potros: 0.1 a 0.15 g NEOMAY/10 kg p.v., equivalente 0.1 g/ 1 o 2 L de agua, cada 12 horas, durante 3 - 5 días.

La siguiente fórmula se puede usar para calcular la cantidad recomendada del medicamento veterinario en g por litro de agua de bebida, leche o sustituto de leche:

$$\text{g NEOMAY agua} = \frac{\text{NEOMAY/kg p.v.} \times \text{medida del peso corporal (kg)}}{\text{Medida diaria del consumo de agua o leche (L) por animal}}$$

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral disuelto en agua de bebida, leche o sustituto de leche.

ADVERTENCIAS:

- No debe usarse este producto 2 días antes del sacrificio de los bovinos, ovinos y caprinos, ni en 5 días antes del sacrificio de las aves, ni 3 días antes del sacrificio de los porcinos, destinados para el consumo humano. Para huevo para consumo humano no existe periodo de retiro (0) días.
- No se administre este producto en equinos destinados para consumo humanos.
- No administrar este producto animales con historial de alergia a la sustancia activa o a los aminoglucósidos.
- No administrar juntos con analgésicos generales y relajantes musculares.
- No administrar junto con otros aminoglucocidos.

- Poner especial atención cuando se administren conjuntamente con diuréticos potentes y sustancias potencialmente ototoxicas o nefrotoxicas.
- Mantener en un fresco y seco y al abrigo de la luz.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

PRESENTACIÓN: sobre de 100 g y 1 kg.

Elaborado por:
Maymo (España)

Importado por:
Mayvet México.

Distribuido en México por:
Internacional Prode S.A. de C.V.
Tel (33) 1199 2700, 1199 3843 y 50
Fax: (33) 1199 3851
Interprode@interprode.com
www.interprode.com